

DOSAGE DE LA TRYPTASEMIE

IDENTITE DU PATIENT

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Sexe (entourer) : F M

ORGANISME DEMANDEUR

Laboratoire Service clinique demandeur

Service demandeur :

Adresse :

Téléphone :

MEDECIN PRESCRIPTEUR

Nom et Prénom :

Téléphone :

SI SUSPICION DE CHOC ANAPHYLACTIQUE :

<u>Date du choc</u> :	<u>Heure du choc</u> :
<u>Signes cliniques :</u>	
<input type="checkbox"/> Cutanéomuqueux	<input type="checkbox"/> Vomissements
<input type="checkbox"/> Hypotension (.....mmHg)	<input type="checkbox"/> Tachycardie
<input type="checkbox"/> Arrêt cardio-respiratoire	
<input type="checkbox"/> Patient décédé	
<u>Grade du choc :</u>	
<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	
<input type="checkbox"/> Adrénaline	
<u>Contexte clinique :</u>	
<input type="checkbox"/> Produits anesthésiques	<input type="checkbox"/> Alimentaire :
<input type="checkbox"/> Piqûre d'hyménoptère	<input type="checkbox"/> Médicament :
<input type="checkbox"/> Transfusion	<input type="checkbox"/> Radiologie, imagerie :
<input type="checkbox"/> Autre :	
<u>TRYPTASE LORS D'UN CHOC</u> : 1 tube sec ou 1 tube EDTA (serum ou plasma conservé entre +2 et +8°C une semaine, congélation à -20°C au delà)	
<input type="checkbox"/> T0 : entre 30 minutes et 2 heures après le choc (ne pas prélever dans les 1 ^{re} minutes : risque de faux négatif) +++	
Noter heure du 1 ^{er} prélèvement ici : ET sur le tube	
<input type="checkbox"/> T 24h ou plus	
<u>IgE spécifiques</u> : 1 tube sec	
<input type="checkbox"/> Latex	
<input type="checkbox"/> Autre(s) :	

AUTRE CIRCONSTANCE de demande de TRYPTASEMIE :

- Tryptase de base
- Mastocytose
- Autre :